

Информация для пользователя

Novosil (Силденафил 50 мг)
полоски для перорального применения

Прежде чем принимать препарат, внимательно прочитайте инструкцию. В ней содержится важная информация.

1. Что такое Силденафил и для чего он используется?

Силденафил — действующее вещество для лечения эректильной дисфункции (импотенции). Это такое состояние организма, при котором мужчина не может достичь или поддержать эрекцию в степени, достаточной для совершения полового акта.

2. Что нужно знать, прежде чем начать принимать Силденафил?

Противопоказания

Запрещено принимать Силденафил совместно с нитратсодержащими препаратами. Такая комбинация может вызвать опасное понижение кровяного давления. Во время консультации с врачом обязательно скажите ему, что принимаете подобные лекарства (их довольно часто прописывают для облегчения стенокардии (боли в груди)). Вам также следует отказаться от Силденафила если вы:

- принимаете средства-донаторы оксида азота (амилнитрит и др.), т.к. комбинация с ними может привести к опасному снижению кровяного давления;
- испытываете аллергию на Силденафил или другие компоненты препарата (перечислены в п. 6);
- имеете серьёзные заболевания сердца или печени;
- имеете пониженное давление;
- перенесли недавно инсульт или инфаркт;
- имеете наследственное заболевание глаз, такое как пигментный ретинит;
- перенесли в прошлом потерю зрения вследствие ишемической оптической нейропатии.

Взаимодействие Силденафила с пищей и алкоголем

Силденафил может приниматься натощак или во время приёма пищи. Однако вы можете обнаружить, что после приёма вместе с едой действие препарата наступает позже. Употребление алкоголя может временно снизить способность к достижению эрекции. Поэтому для получения максимального эффекта не рекомендуется употреблять чрезмерное количество алкоголя.

Действие Силденафила во время беременности и кормления грудью

Силденафил не предназначен для женщин.

Вождение автомобиля

Силденафил может вызвать головокружение и временное ухудшение зрения. Поэтому удостоверьтесь в отсутствии указанных побочных эффектов прежде, чем сесть за руль.

3. Как принимать Силденафил?

Всегда принимайте Силденафил так, как рекомендовал лечащий врач. Если вы в чём-либо не уверены, обязательно проконсультируйтесь с доктором или фармацевтом.

Обычная стартовая доза — 50 мг. Принимают препарат не чаще одного раза в день за 1 ч до запланированного занятия сексом. Пластинку с Силденафилом запивать водой не обязательно, но можно.

Силденафил начинает действовать только при наличии сексуальной стимуляции. Скорость появления эффекта у разных мужчин может варьировать. Обычно эрекция появляется через 0,5-1 ч после приёма. Если препарат принимался во время или после еды с высоким содержанием жира, эффект может появиться несколько позже. Препарат не помогает или же эрекция длится меньше, чем нужно? Сообщите об этом врачу. В любом случае нельзя принимать больше диспергируемых пластинок, чем приписано доктором. Если вы превысили установленную дозу, обратитесь к врачу.

Инструкция по применению

Важно! Нельзя брать пластинки влажными руками.

1. Возьмите пакетик в руки. Найдите на укороченной стороне изображение стрелки. Пакетик запечатан негерметично.
2. Ухватитесь пальцами за краешки сторон пакетика там, где нарисована стрелка.
3. Осторожно потяните обе части пакетика в разные стороны. Внутри вы увидите пластинку препарата.
4. Положите пластинку на язык, подождите, пока она полностью растворится.

4. Возможные побочные эффекты.

Как и все лекарственные средства, данный препарат может иногда вызывать побочные эффекты. Обычно они проявляются в умеренной степени и исчезают через короткий промежуток времени.

Если во время или после полового акта вы почувствовали боль в груди, сделайте следующее:

- Примите полулежачее положение и попробуйте расслабиться.
- Не принимайте нитратсодержащие препараты для устранения боли.
- Немедленно свяжитесь с врачом.

Все лекарственные препараты, содержащие Силденафил, могут вызывать аллергическую реакцию. Нужно немедленно обратиться к врачу, если появился хотя бы один из следующих симптомов:

- внезапное затруднение дыхания;
- головокружение;
- отёк век, лица, губ или горла.

Если наблюдается слишком длительная (иногда болезненная) эрекция, продолжающаяся более 4 ч, немедленно обратитесь к врачу. Если после приёма лекарства у вас произошло временное ухудшение или потеря зрения, прекратите приём Силденафила и обратитесь к врачу.

Среди побочных эффектов наиболее распространена (примерно в 1 случае из 10) головная боль. Кроме неё чаще всего (менее 1 случая на 10 человек) встречается покраснение лица, диспепсия, нарушение зрения (включая изменение цветопередачи и светочувствительности, размытость, снижение остроты), заложенность носа.

В гораздо более редких случаях (не более 1 случая на 100 человек) встречается рвота, кожная сыпь, покраснение сосудов по краям глаз, раздражение глаз, красные глаза, боль в глазах, раздвоение в глазах, дискомфорт в глазах, слезоточивость, нерегулярное или учащённое сердцебиение, боль в мышцах, сонливость, ухудшение осязания, головокружение, звон в ушах, тошнота, сухость во рту, кровоточивость в половом члене, наличие крови в сперме, боль в груди, чувство усталости.

В очень редких случаях (не более 1 случая на 1000 человек) наблюдается повышение давления, понижение давления, обморочное состояние, инсульт, инфаркт, носовое кровотечение, временное ухудшение или потеря слуха.

Имеются сообщения, что в постмаркетинговый период наблюдались следующие побочные эффекты: сильное сердцебиение, боль в груди, внезапная смерть или временная остановка кровоснабжения мозга. Большинство из них (но не все) встречались у мужчин, имевших до приёма лекарства проблемы с сердцем. Не представляется возможным определить, являются ли эти события исключительно следствием приёма Силденафила. Сообщалось также о случаях судорог, серьёзных кожных реакциях, сопровождавшихся сыпью, волдырями, шелушением кожи, и боли, требующей немедленной медицинской помощи.

Сообщения о побочных эффектах

Если у вас после приёма лекарства наблюдались какие-либо побочные эффекты, сообщите о них врачу или фармакологу. Вы также можете сообщить о них по схеме «жёлтой карты» на сайте mhra.gov.uk/yellowcard. Этим вы поможете собрать больше информации, касающейся безопасности данного лекарственного средства.

5. Как хранить Силденафил?

Хранить лекарство нужно в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Специальные условия хранения для данного препарата отсутствуют. Запрещено использовать лекарство после окончания срока хранения, указанного на упаковке.

6. Дополнительная информация.

Содержание действующего вещества:

- Действующим веществом препарата является Силденафила цитрат.
- В каждой пластинке содержится 50 мг Силденафила цитрата.

Вспомогательные компоненты препарата:

- пуллулан (полимер);
- метилоксипропилцеллюлоза;
- сукралоза;
- вкусовые добавки и пр.

Содержание упаковки препарата Novosil-50 mg (Sildenafil)

В картонной упаковке препарата Novosil-50 mg (Sildenafil) содержится 7 пластинок, упакованных в трёхслойные пакетики из алюминиевой фольги. Дополнительно каждая пластинка покрыта тонкой плёнкой.

Производитель:

Aavishkar Oral Strips Pvt Ltd

Plot No. 109/3, IDA Phase 2, Sector 2, Lane 6,

Cherlapalli, Hyderabad-500051, India.